

Amtstierärztlicher Arzneimittel-, Anwendungs- u. Abgabebeleg zur Behandlung von Bienenvölkern

Nr.:

(Bestellung von Varroosebekämpfungsmitteln über Behördengeschäft)

Arzneimittelabgabe08.xls

Bitte gut leserlich ausfüllen!

Nr.	Name, Vorname	PLZ, Wohnort, Straße	Anzahl Völk.+Abl.	Arzneimittelbezeichnung + Abgabemenge			
				Perizin	Bayvarol	Thymovar	Apiguard
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Vom Amtstierarzt auszufüllen:			Gesamt:				
Diagnose Varroose		<u>Chargen-Nr. Perizin:</u>	Perizin: Dosierung, Anwendung i. brutfreien Volk Emulsion: 1ml Perizin+49 ml Wasser/Volk, Ableger die Hälfte;		Wartezeit Perizin mindestens 6 Wochen vor Beginn der Tracht nicht mehr anwenden		
Amtstierarzt / Landkreis:		<u>Chargen-Nr. Perizin-Set:</u>	2 x im Abstand von 7 Tagen		Wartezeit Bayvarol nicht während der Tracht bzw. vor der Honigernte anwenden. Honig: 0 Tage		
		<u>Chargen-Nr. Bayvarol:</u>	Dosierung: Bayvarol 4 Streifen/Volk, Ableger die Hälfte; für 4-6 Wochen im Volk belassen		Wartezeit Thymovar Nicht vor und während der Tracht einsetzen. Im Brutraum während der Behandlung befindliche Waben dürfen im folgenden Jahr nicht geschleudert werden. Honig: 0 Tage		
		<u>Chargen-Nr. Thymovar:</u>	Dosierung Thymovar: -Magazinbeute (1 Brutraum) 1 Plättchen im 3-4 wöchigen Abstand -Magazinbeute (2 Brutraum) 2 Plättchen im 3-4 wöchigen Abstand -Dadantbeute 1 1/2 Plättchen im 3-4 Wöchigen Abstand		Wartezeit Oxuvar: (nicht während d. Tracht anwenden)		
Unterschrift des Amtstierarztes		<u>Chargen-Nr. Oxuvar</u>	Dosierung Oxuvar: 30-50ml (je Wabengasse 5-6 ml) handwarm über die die Bienen Träufeln; einmalig anwenden; Arbeitsschutz beachten!		Im brutfreien Zustand im Spätherbst anwenden; Honig darf dann erst im darauffolgenden Frühjahr entnommen werden		